

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Diketahui responden dengan perilaku merokok sebanyak 89 (60,13%), dan responden dengan perilaku tidak merokok sebanyak 59 (39,87%).
2. Diketahui responden dengan kejadian tuberkulosis paru BTA positif sebanyak 20 (13,5%), dan responden dengan kejadian tuberkulosis paru BTA negatif sebanyak 128 (86,5%).
3. Ada Hubungan perilaku merokok dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja puskesmas wiralaga (p-value= 0,000).

5.2 Saran

1. Bagi responden
Setelah penelitian ini diharapkan pasien TB baik yang dalam pengobatan atau yang telah selesai pengobatan dapat memahami terkait bahaya merokok bagi kesehatan sehingga dapat merubah kebiasaan merokoknya atau menjauhi orang yang merokok agar tidak menjadi perokok pasif.
2. Bagi kampus Universitas Muhammadiyah
Setelah penelitian ini dipublikasikan diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumber guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya terkait dengan aktivitas merokok dan TB paru.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi refransi terkait dengan rokok dan TB paru, serta menjadi rujukan penelitian yang lebih besar dan memiliki dampak manfaat bagi kemajuan keperawatan.